



# Емієндо<sup>М</sup>®

Високоєфективний комбінований контактний-системний фунгіцид для захисту від захворювань томатів, цибулі, картоплі, винограду та хмелю

- ШВИДКА ДІЯ та ДОВГОТРИВАЛА ЗАХИСНА АКТИВНІСТЬ
- ВИЯВЛЯЄ ВІДМІННУ ПРОФІЛАКТИЧНУ та ЛІКУВАЛЬНУ ДІЮ
- НЕ ФІТОТОКСИЧНИЙ
- ЗАПОБИГАЄ ВИНИКНЕННЮ РЕЗИСТЕНТНОСТІ




#### ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

валіфенал, 6,12% + манкоцеб, 70,6%

#### ПРЕПЕРАТИВНА ФОРМА:

Водорозчинні гранули (ВГ)  
(гранули, що диспергуються у воді)







**BELCHIM**  
CROP PROTECTION

# Емемдо<sup>М</sup>

Інноваційний високоефективний фунгіцид проти пероноспорозу цибулі, фітофторозу томатів і картоплі, мільдю винограду, несправжньої борошністої роси хмелю

- Валіфенал дуже активний проти **проростання спор** – він інгібує утворення структури патогену, зародкових труб та зародковий бруньок
- Валіфенал демонструє **лікувальну активність** шляхом активної протидії зростанню міцелію всередині покривних тканин, руйнуючи кінчики гіфів, що проникають через стінки клітин
- Дія на стінки клітин спричиняє інгібування репродуктивних утворень, що зумовлює **руйнівну та антиспоруючу активність**



### Як працює:

порушує синтез клітинної стінки

### Дія спрямована на:

міцелій (усередині рослини)  
спори (на поверхні рослини)

## Застосування препарату

Культура	Норма витрати, л/га	Сфера застосування, шкідливий об'єкт	Спосіб, час обробок	Строки виходу людей для поновлення робіт, днів	Максимальна кратність обробок	Строк останньої обробки (до збирання врожаю), днів
Виноградники	2,0 – 2,5	Мільдю, оїдіум, сіра гниль	Обприскування культури в період вегетації	7/3	2	30
Томати Картопля	2,0	Фітофтороз, альтернаріоз			4	20
Цибуля		Пероноспороз				
Хмільники	2,30 – 8,0	Несправжня борошніста роса			1	30